

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg (konsoliderad elektronisk utgåva)

Ändringar införda t.o.m TSFS 2022:85.

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

Innehåll

1 kap. Allmänt	1
Syfte.....	1
Tillämpningsområde	1
Definitioner.....	1
Undantag.....	2
2 kap. Sjukvårdens utformning	2
Allmänt	2
Tele Medical Assistance Service	3
Bemanning	3
3 kap. Sjukvårdsutrymmen	3
4 kap. Läkemedel, behandlingsutrustning m.m.	4
Fartygsapotek.....	4
Läkemedel och behandlingsutrustning för livbåtar och livflottar	5
Narkotiska läkemedel	5
Passagerarfartyg.....	6
5 kap. Motgifter	6
6 kap. Patientjournaler och tystnadsplikt	6
7 kap. Inventering	7
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser	8
Bilaga A. Läkemedel	9
Bilaga B. Läkemedel och deras användning	19
Bilaga C. Behandlingsutrustning m.m.	33
Bilaga D. Läkemedel och behandlingsutrustning m.m. för fartyg, som behöver högst två timmar för att nå anlöpbar hamn	39
Bilaga E. Läkemedel och behandlingsutrustning m.m. för livbåtar och livflottar	41

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg; (konsoliderad elektronisk utgåva)

TSFS 2021:80

Konsoliderad elektronisk
utgåva

beslutade den 28 oktober 2021. Ändringar införda t.o.m TSFS 2022:85.

SJÖFART

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

1 kap. Allmänt

Syfte

1 § Syftet med dessa föreskrifter är att främja goda arbets- och levnadsförhållanden för anställda ombord på fartyg genom att de får tillgång till sjukvård och medicin ombord vid sjukdoms- och olycksfall.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller svenska fartyg som används till sjöfart och som har någon ombordanställd.

3 § Dessa föreskrifter gäller inte fartyg i nationell sjöfart som trafikerar fartområde C–E.

Dessa föreskrifter gäller inte örlogsfartyg,

4 § För fartyg i inlandssjöfart gäller inte 3 kap.

Definitioner

5 § I dessa föreskrifter används följande definitioner.

anlöpbar hamn en hamn längs fartygets planerade rutt som det kan anlöpa för att ge en patient tillgång till kvalificerad sjukvård

farliga ämnen ämnen som definieras som farligt gods i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

fartområde område definierat i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:8) om fartområdenas indelning

<i>fartyg i inlands-sjöfart</i>	farkost som har ett unionscertifikat för inlandssjöfart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:60) om fartyg i inlandssjöfart
<i>fartyg i nationell sjöfart</i>	fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart
<i>motgift</i>	ämne som används för att motverka skadlig påverkan på människor, direkt eller indirekt, av ett eller flera <i>farliga ämnen</i>
<i>ombordanställd</i>	person som utför en yrkesuppgift ombord på ett fartyg, inbegripet personer under utbildning och lärlingar, med undantag för lotsar och landbaserad personal som utför arbete ombord när fartyget ligger vid kaj
<i>redare</i>	fartygets ägare eller den som har övertagit ansvaret för fartygets drift från ägaren
<i>sjukvårdare</i>	person som har ett giltigt certifikat som sjukvårdare ombord enligt 4 kap. 9 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal eller i fråga om fartyg som inte omfattas av den förordningen, person som har motsvarande utbildning som sjukvårdare
<i>sjukvårdsutrymme</i>	utrymme som används för sjukvård som behandlingsrum eller sjukförlägningsrum
<i>skolfartyg</i>	fartyg som huvudsakligen används i utbildningsverksamhet
<i>Tele Medical Assistance Service</i>	Sjöfartsverkets förmedling av läkarråd till fartyg via telekommunikation

Undantag

6 § Transportstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, medge undantag från dessa föreskrifter om det inte strider mot internationella överenskommelser eller gemenskapsrättslig lagstiftning.

2 kap. Sjukvårdens utformning

Allmänt

1 § Befälhavaren ansvarar för sjukvården ombord i enlighet med 4 kap. 9 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

2 § En ombordanställd ska vid behov få bästa möjliga sjukvård ombord.

Sjukvård enligt första stycket ska vara kostnadsfri för den ombordanställda.

Sjukvård ombord får inte ersätta vård som kan ges av legitimerad sjukvårdspersonal.

Tele Medical Assistance Service

3 § För att säkerställa att behandlingen görs på korrekt sätt ska sjukvårdare ombord samråda med en läkare från Tele Medical Assistance Service innan han eller hon ger sjukvård ombord, om det inte är uppenbart onödigt.

Vid sjukvård som kräver akut behandling ska sjukvårdare samråda med en läkare från Tele Medical Assistance Service så snart det är möjligt.

4 § I hamn får sjukvårdaren använda Tele Medical Assistance Service endast då han eller hon inte kan få den hjälp som krävs på annat sätt.

5 § Vid samråd med Tele Medical Assistance Service ska sjukvårdaren använda blanketten Läkarkonsultation från fartyg.

Bemannning

6 § Ett fartyg som går i utrikes fart i mer än tre dygn och som har minst 100 ombordanställda, ska ha en läkare ombord under resans varaktighet med ansvar för den medicinska behandlingen av de ombordanställda.

7 § Ett fartyg som inte omfattas av 6 § ska ha minst en sjukvårdare ombord som inom ramen för sitt ordinarie arbete sköter sjukvården och administreringen av läkemedel till de ombordanställda.

Allmänna råd

Sådan sjukvårdare kan vara befälhavaren eller annan person i sjöpersonalen som delegerats sjukvårdsuppgifter i enlighet med 4 kap. 9 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

3 kap. Sjukvårdsutrymmen

1 § På ett fartyg med en bruttodräktighet mellan 200 och 500 ska det finnas ett behandlingsrum, om det är rimligt och genomförbart med hänsyn till fartygets konstruktion och utformning.

På ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 ska det finnas ett behandlingsrum.

På ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 och med en besättning på minst 15 personer som regelmässigt sysselsätts i resor med mer än tre dygns varaktighet ska det finnas ett behandlingsrum och ett sjukförläggningsrum. Behandlingsrummet och sjukförläggningsrummet får utgöras av ett gemensamt sjukvårdsutrymme.

Till ett sjukvårdsutrymme ska ett separat hygienutrymme finnas.

2 § Ett sjukvårdsutrymme enligt 1 § ska ha ett tillräckligt antal vårdplatser, med hänsyn till antalet ombordanställda.

Om varje sjöman i fartygets största besättning har en egen bostad inklusive hygienutrymme, kan vårdplatser i sjukvårdsutrymmet avvaras.

3 § Ett sjukvårdsutrymme på ett fartyg ska vara beläget, utformat och utrustat på ett lämpligt sätt för att möjliggöra en godtagbar sjukvård, tillsyn samt förläggning.

Allmänna råd

Sjukvårdsutrymmet bör placeras på lämplig plats för att bland annat möjliggöra bårtransport till och från sjukvårdsutrymmet under alla väderleksförhållanden samt skapa godtagbara förhållanden med avseende på buller- och vibrationsnivåer.

Sjukvårdsutrymmet bör utformas så att det är lättstädat, att det finns nödvändig fri golvyta kring vårdplatsen, att vårdbritten är placerad i långskeppsled och att ett separat hygienutrymme finns.

Sjukvårdsutrymmet bör vara utrustat med:

- 1. Slingerskydd till vårdbritten.*
- 2. Upphängningsanordning för eventuell behandlingsutrustning.*
- 3. Kommunikationsmedel för kontakt med övriga fartyget och Tele Medical Assistance Service.*
- 4. Korrekt förvaringsmöjlighet för läkemedel och behandlingsutrustning.*

4 § Ett sjukvårdsutrymme ska alltid hållas i sådant skick att det omedelbart kan användas för sitt ändamål.

4 kap. Läkemedel, behandlingsutrustning m.m.

Fartygsapotek

1 § Bestämmelser om rekvisition av läkemedel finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

2 § Med hänsyn till besättningens storlek och tiden till en anlöpbar hamn ska det finnas läkemedel och behandlingsutrustning ombord på ett fartyg enligt tabellen. Vad gäller skolfartyg ska eleverna räknas som besättning.

Fartygsapotekets minsta urval och mängd av läkemedel och behandlingsutrustning framgår av bilagorna A och C.

Läkemedlens användningsområden och doseringsanvisningar framgår av bilaga B.

Tid till anlöpbar hamn	Besättningens storlek	Fartygsapotek/behandlingsutrustning
2–12 timmar	≤ 12 personer	A1
	13–50 personer	A2
	51–100 personer	A3

> 12 timmar	≤ 12 personer 13–50 personer 51–100 personer	B1 B2 B3
-------------	--	----------------

Ombord på ett fartyg som behöver högst två timmar för att nå en anlöpbar hamn ska det, för varje påbörjat antal av 25 personer i besättningen, finnas en uppsättning av de läkemedel och behandlingsutrustning som anges i bilaga D.

3 § Mängden av läkemedel och behandlingsutrustning enligt 2 § kan frångås efter samråd mellan befälhavare och läkare om fartyget har högst tre ombordanställda och mer än två timmar till en anlöpbar hamn.

Befälhavaren ska dokumentera ett sådant samråd. Dokumentationen ska finnas tillgänglig ombord.

4 § Befälhavaren ska fastställa mängden av läkemedel och behandlingsutrustning enligt 2 § i samråd med läkare om fartyget har en större besättning än 100 personer och har mer än två timmar till en anlöpbar hamn.

Befälhavaren ska dokumentera ett sådant samråd. Dokumentationen ska finnas tillgänglig ombord.

5 § De läkemedel som är angivna i dessa föreskrifter får ersättas med likvärdiga läkemedel. Med ett likvärdigt läkemedel avses ett sådant läkemedel som en läkare särskilt förskrivit eller som Läkemedelsverket beslutat vara likvärdigt.

6 § Endast befälhavaren, eller den person som befälhavaren har delegerat sjukvårdsuppgifterna till, får lämna ut läkemedel.

7 § Fartygsapoteket ska förvaras så att det är oåtkomligt för obehöriga.

Läkemedel och behandlingsutrustning för livbåtar och livflottar

8 § Varje livbåt och livflotte ska, för varje påbörjat antal av 25 personer som den får medföra, vara försedd med en uppsättning av läkemedel och behandlingsutrustning enligt bilaga E.

9 § Förpackningarna med läkemedel ska vara märkta, förvarade på vattentätt sätt och försedda med datum för senaste översyn.

Narkotiska läkemedel

10 § Ett narkotiskt läkemedel får inte medföras ombord i annat urval eller i större mängd än vad som anges i dessa föreskrifter, om inte en läkare finns ombord enligt 2 kap. 6 §. Även om en läkare finns ombord enligt 2 kap. 6 § får ett narkotiskt läkemedel inte ingå i den uppsättning av läkemedel som ska medföras enligt bilaga E.

11 § Inköp och förbrukning av ett narkotiskt läkemedel ska, av befälhavaren eller den person som sjukvårdsuppgifterna har delegerats till, antecknas i en förbrukningsjournal.

Allmänna råd

*Förbrukningsjournalen förvaras lämpligast i anslutning till fartygs-
apoteket. Följande uppgifter bör noteras vid uttag för sjukvårds-
behandling, utbyte, kassering eller komplettering:*

- Datum.*
- Uttaget läkemedel, typ och mängd för sjukvårdsbehandling,
utbyte eller kassering.*
- Tillfört läkemedel, typ och mängd.*
- Mängd efter uttag, utbyte, kassering eller komplettering.*
- Eventuella kommentarer.*
- Underskrift.*

Passagerarfartyg

12 § Ett passagerarfartyg ska medföra läkemedel och behandlingsutrustning för att nödvändig hjälp åt passagerare ska kunna ges vid olycksfall eller akuta sjukdomsfall. Sådana läkemedel och behandlingsutrustning ska bestämmas i samråd med en läkare.

5 kap. Motgifter

1 § Ett fartyg som transporterar farliga ämnen ombord, oavsett i vilken form ämnena förekommer och även om de endast förekommer som spill eller lastrester, ska ha motgifter och behandlingsutrustning enligt bilaga 2 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).

Om motgifter eller behandlingsutrustning som anges i bilaga 2 till TSFS 2022:52 ingår i bilagorna A, C eller D till dessa föreskrifter, kan mängden motgifter och behandlingsutrustning som avses i den först nämnda bilagan minskas i motsvarande omfattning. (TSFS 2022:62)

2 § Fartyg vars driftförhållanden inte alltid medger att uppgifter om vilka farliga ämnen som ska transporteras ombord meddelas i tillräckligt god tid, får i reguljärtrafik, när resornas längd understiger två timmar, begränsa motgifterna till sådana som ska ges inom en tid som inte överstiger överfartens normala tid.

6 kap. Patientjournaler och tystnadsplikt

1 § Den som ger sjukvård eller lämnar ut läkemedel ska anteckna varje sjukvårdsinsats och läkemedelsutdelning i en separat journal (patientjournal) för varje behandlad person. Varje anteckning ska innehålla uppgift om vem som har gjort anteckningen och när den gjordes.

Allmänna råd

En patientjournal bör innehålla

- 1. uppgift om patientens identitet,*
- 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården inklusive symptom,*

3. uppgift om vad som framkommit vid samråd med Tele Medical Assistance Service avseende diagnos och åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och eventuellt dennes närstående, samt
6. eventuell uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

2 § En patientjournal får föras i pappersform eller elektronisk form.

3 § Befälhavaren ska säkerställa att patientjournaler förvaras på ett säkert sätt. De ska endast vara tillgängliga för befälhavaren och den person som sjukvårdsuppgifterna har delegerats till.

4 § En journalhandling som ingår i en patientjournal ska bevaras minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Därefter får journalhandlingarna gallras.

5 § Bestämmelser om tystnadsplikt finns i 6 kap. 12–13 och 15–16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

7 kap. Inventering

1 § Befälhavaren eller den person som sjukvårdsuppgifterna har delegerats till ska inventera fartygsapoteket en gång per år. Detta gäller även livbåtarnas läkemedel och behandlingsutrustning.

En livflottes läkemedel och behandlingsutrustning ska inventeras i samband med dess ordinarie service.

2 § Vid inventering enligt 1 § ska det kontrolleras att

1. sortiment och mängd läkemedel och behandlingsutrustning överensstämmer med dessa föreskrifter,
2. läkemedel och behandlingsutrustning förvaras på ett riktigt sätt, och
3. sista förbrukningsdag inte har passerat.

3 § Befälhavaren eller den person som sjukvårdsuppgifterna har delegerats till ska dokumentera inventeringen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

(TSFS 2021:80)

1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2021.
2. Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens beslut om urval och mängd av läkemedel och behandlingsutrustning som gäller då denna författning träder i kraft gäller även efter författningens ikraftträdande.

(TSFS 2022:62)

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2022.

(TSFS 2022:85)

Denna författning träder i kraft den 30 augusti 2022.

Bilaga A. Läkemedel

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar						Anmärkning, gruppnr
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	
Adrenalin injektionsvätska i förfylld penna 1 mg/ml	1 x 0,3 ml	5	10	10	5	10	10	9.4
<i>Adrenaline solution for injection in pre-filled pen 1 mg/ml</i>	<i>1 x 0,3 ml</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>9.4</i>
Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml	10 x 1 ml	1	1	2	1	1	2	2.5
<i>Adrenaline solution for injection 1 mg/ml</i>	<i>10 x 1 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2.5</i>
Antacida tuggtabletter	1 x 30 st	2	2	3	3	3	7	1.1
<i>Antacids chewable tablets</i>	<i>1 x 30 pcs</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>7</i>	<i>1.1</i>
Atovakvon/proguanil tabletter 250 mg / 100 mg	1 x 12 st	Enligt befälhavarens bedömning						5.1
<i>Atovaquone/proguanil tablets 250 mg / 100 mg</i>	<i>1 x 12 pcs</i>	<i>In accordance with the master's assessment</i>						<i>5.1</i>
Atropin injektionsvätska 0,5 mg/ml	10 x 1 ml	1	1	1	1	1	1	2.6
<i>Atropine solution for injection 0.5 mg/ml</i>	<i>10 x 1 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2.6</i>
Betametason tabletter 0,5 mg	1 x 30 st	1	1	1	1	2	3	9.3
<i>Beta-methasone tablets 0.5 mg</i>	<i>1 x 30 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>9.3</i>
Cefotaxim injektionsvätska	10 x 1 g	–	–	–	3	3	3	4.1

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar						Anmärkning, grupper
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	
<i>Cefotaxime solution for injection</i>	10 x 1 g	–	–	–	3	3	3	4.1
Ciprofloxacin tabletter 250 mg	1 x 20 st	1	1	2	2	3	4	1.6, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12
<i>Ciprofloxacin tablets 250 mg</i>	1 x 20 pcs	1	1	2	2	3	4	1.6, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12
Clostridium tetanitoxid, injektionsvätska	5 x 0,5 ml	1	1	1	1	1	2	Kylvara, 5.4
<i>Clostridium tetani toxoid, solution for injection</i>	5 x 0,5 ml	1	1	1	1	1	2	Cool storage, 5.4
Diazepam klymsa 10 mg	5 x 2,5 ml	1	1	1	1	1	1	Narkotika, 6.6
<i>Diazepam clyster 10 mg</i>	5 x 2.5 ml	1	1	1	1	1	1	Narcotics, 6.6
Digoxin tabletter 0,13 mg	1 x 100 st	1	1	1	1	1	1	2.7
<i>Digoxin tablets 0.13 mg</i>	1 x 100 pcs	1	1	1	1	1	1	2.7
Diklofenak stolpiller 50 mg	1 x 10 st	1	1	1	1	2	4	1.3
<i>Diclofenac suppositories 50 mg</i>	1 x 10 pcs	1	1	1	1	2	4	1.3
Disulfiram-bensylbensoat liniment, 225 mg/g + 20 mg/g	1 tub á 100 g	–	–	–	1	2	4	Kylvara, 3.7
<i>Disulfiram-benzyl bensoate liniment 225 mg/g + 20 mg/g</i>	1 tube of 100 g	–	–	–	1	2	4	Cool storage, 3.7

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar						Anmärkning, gruppnr	
		A1	A2	A3	B1	B2	B3		
Doxycyklin tabletter 100 mg	1 x 10 st	1	1	1	2	4	6	4.4, 4.8, 4.11	
<i>Doxycycline tablets 100 mg</i>	<i>1 x 10 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>4.4, 4.8, 4.11</i>	
Ekonazol slidpiller 150 mg	1 x 3 st	–	–	–	2	2	3	4.9	
<i>Econazole pessaries 150 mg</i>	<i>1 x 3 pcs</i>	–	–	–	2	2	3	4.9	
Fenoximetylpenicillin tabletter 1 g	1 x 40 st	1	1	2	2	4	6	4.3	
<i>Phenoxymethylpenicillin tablets 1g</i>	<i>1 x 40 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>4.3</i>	
Furosemid injektionsvätska 10 mg/ml	10 x 2 ml	1	1	1	1	1	1	2.4	
<i>Furosemide solution for injection 10 mg/ml</i>	<i>10 x 2 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2.4</i>	
Furosemid tabletter 40 mg	1 x 25 st	1	1	1	1	1	1	2.3	
<i>Furosemide tablets 40 mg</i>	<i>1 x 25 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2.3</i>	
Fusidinsyra salva 2 %	1 tub à 15 g	1	1	2	1	2	4	3.3	
<i>Fusidic acid ointment 2 %</i>	<i>1 tube of 15 g</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3.3</i>	
Glukos infusionsvätska 50 mg/ml, buffrad	1 x 1000 ml	1	1	1	2	4	6	12.1	
<i>Glucose solution for infusion 50 mg/ml, buffered</i>	<i>1 x 1000 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>12.1</i>	
Glyceryltrinitrat oral spray 0,4 mg/dos	1 flaska x 200 doser	1	1	1	1	1	1	2.1	

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar						Anmärkning, grupper
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	
<i>Glyceryl trinitrate oral spray 0.4 mg/dose</i>	<i>1 bottle x 200 doses</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2.1</i>
Hydrokortison kräm 1 %	1 tub à 20 g	1	2	3	1	2	4	3.2
<i>Hydrocortisone cream 1 %</i>	<i>1 tube of 20 g</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3.2</i>
Ibuprofen tabletter 200 mg	1 x 30 st	1	1	2	2	2	4	7.4
<i>Ibuprofen tablets 200 mg</i>	<i>1 x 30 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>7.4</i>
Kalamin kalciumhydroxid liniment	1 x 100 g	1	1	2	2	3	4	3.5
<i>Calamine-calcium hydroxide liniment</i>	<i>1 x 100 g</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3.5</i>
Kloramfenikol ögonsalva 1 %	1 tub à 4 g	1	2	3	2	3	4	10.1
<i>Chloramphenicol eye ointment 1 %</i>	<i>1 tube of 4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>10.1</i>
Klorhexidin desinfektionsvätska 0,5 mg/ml	1 x 125 ml	1	1	2	1	2	3	14.2
<i>Chlorhexidine solution for disinfection 0.5 mg/ml</i>	<i>1 x 125 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>14.2</i>
Klorhexidin-etanol 5 mg/ml	1 x 250 ml	1	1	2	1	2	3	14.4
<i>Chlorhexidine-ethanol 5 mg/ml</i>	<i>1 x 250 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>14.4</i>
Klorhexidin munskölj 2 mg/ml	1 x 300 ml	1	1	2	1	1	2	14.6

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar						Anmärkning, gruppnr
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	
<i>Chlorhexidine mouthwash, 2 mg/ml</i>	<i>1 x 300 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>14.6</i>
Klorokin tabletter 250 mg	1 x 100 st	Enligt befälhavarens bedömning						5.2
<i>Chloroquine tablets 250 mg</i>	<i>1 x 100 pcs</i>	<i>In accordance with the master's assessment</i>						<i>5.2</i>
Klotrimazol kräm 1 %	1 tub à 20 g	–	–	–	2	3	4	4.10
<i>Clotrimazole creme 1 %</i>	<i>1 tube of 20 g</i>	–	–	–	2	3	4	<i>4.10</i>
Kol, medicinskt	1 flaska à 25 g	2	2	4	10	15	20	13.1
<i>Activated charcoal</i>	<i>1 bottle of 25 g</i>	2	2	4	10	15	20	<i>13.1</i>
Lidokain gel 2 %	2 x 30 g	1	1	1	1	1	1	8.3
<i>Lidocaine gel 2 %</i>	<i>2 x 30 g</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>8.3</i>
Lidokain injektionsvätska 10 mg/ml	5 x 20 ml	1	1	1	1	1	1	8.1
<i>Lidocaine solution for injection 10 mg/ml</i>	<i>5 x 20 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>8.1</i>
Lidokain salva 5 %	2 tub à 10 g	1	2	3	2	3	4	1.10, 3.4, 8.2
<i>Lidocaine ointment 5 %</i>	<i>2 tubes of 10 g</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1.10, 3.4, 8.2</i>
Loperamid tabletter 2 mg	1 x 40 st	1	1	1	2	4	6	1.5
<i>Loperamide tablets 2 mg</i>	<i>1 x 40 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>1.5</i>
Loratadin tabletter 10 mg	1 x 14 st	1	1	1	2	2	3	3.6, 11.3
<i>Loratadine tablets 10 mg</i>	<i>1 x 14 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3.6, 11.3</i>

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar						Anmärkning, grupper
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	
Meflokin tabletter 250 mg	1 x 6 st	Enligt befälhavarens bedömning						5.3
<i>Mefloquine tablets 250 mg</i>	<i>1 x 6 pcs</i>	<i>In accordance with the master's assessment</i>						5.3
Meklozin tabletter 25 mg	1 x 10 st 1 x 100 st	3 –	5 –	– 1	– 1	– 2	– 2	6.1
<i>Meclozine tablets 25 mg</i>	<i>1 x 10 pcs 1 x 100 pcs</i>	3 –	5 –	– 1	– 1	– 2	– 2	6.1
Metoprolol depottabletter 100 mg	1 x 28 st	–	–	–	1	1	2	2.2
<i>Metoprolol prolonged release tablets 100 mg</i>	<i>1 x 28 pcs</i>	–	–	–	1	1	2	2.2
Metronidazol tabletter 400 mg	1 x 14 st	2	2	2	2	3	4	1.7, 4.13
<i>Metronidazole tablets 400 mg</i>	<i>1 x 14 pcs</i>	2	2	2	2	3	4	1.7, 4.13
Mjukgörande kräm/salva	1 tub à 100 g	1	1	1	1	2	4	3.1
<i>Softening ointment</i>	<i>1 tube of 100 g</i>	1	1	1	1	2	4	3.1
Morfin injektionsvätska 10 mg/ml	10 x 1 ml	1	1	1	1	2	2	Narkotika, 1.4, 2.8, 7.3
<i>Morphine solution for injection 10 mg/ml</i>	<i>10 x 1 ml</i>	1	1	1	1	2	2	<i>Narcotics, 1.4, 2.8, 7.3</i>
Natriumcitrat (dihydrat) Natriumlaurylsulf oacetat	4 tuber x 5 ml	–	–	–	1	1	2	1.9
<i>Sodium citrate (dihydrate) Sodium lauryl sulfoacetate</i>	<i>4 tubes of 5 ml</i>	–	–	–	1	1	2	1.9

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar						Anmärkning, gruppnr
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	
Natriumklorid spolvätska 9 mg/ml	20 x 30 ml	1	1	2	2	3	4	10.3, 14.3
<i>Sodium chloride irrigation solution 9 mg/ml</i>	<i>20 x 30 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>10.3, 14.3</i>
Natriumklorid-kaliumklorid-kalciumklorid-Magnesiumklorid-natriumacetat infusionsvätska 10 %	1 x 1000 ml	1	1	1	2	4	8	12.2
<i>Sodium chloride-Potassium chloride-Calcium chloride-Magnesium chloride-Sodium acetate solution for infusion 10 %</i>	<i>1 x 1000 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>12.2</i>
Natriumklorid - succinylerat gelatin infusionsvätska	1 x 500 ml	1	1	1	2	4	6	12.3
<i>Sodium chloride - succinylated gelatin solution for infusion</i>	<i>1 x 500 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>12.3</i>
Natrium-pikosulfat droppar 7,5 mg/ml	1 x 30 ml	–	–	–	1	2	3	1.8
<i>Sodium picosulfate drops 7.5 mg/ml</i>	<i>1 x 30 ml</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1.8</i>
Noskapin tabletter 50 mg	1 x 15 st	1	1	2	2	4	6	9.1
<i>Noscapine tablets 50 mg</i>	<i>1 x 15 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>9.1</i>

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar						Anmärkning, grupper
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	
Omeprazol kapslar 20 mg	1 x 14 st	1	2	3	2	3	4	1.2
<i>Omeprazole capsules 20 mg</i>	<i>1 x 14 pcs</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1.2</i>
Oxitetracyklin-hydrokortison polyximin B örondroppar	1 tub x 5 ml	–	–	–	1	1	2	11.1
<i>Oxytetra-cycline hydrochloride - hydrocorti-sone acetate - Polymyxin B sulfate ear drops</i>	<i>1 tube x 5 ml</i>	–	–	–	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>11.1</i>
Oxymetazolin näsdroppar 0,5 mg/ml	1 x 20 endospipetter	2	2	5	2	5	7	11.4
<i>Oxymetazoline nasal drops 0.5 mg/ml</i>	<i>1 x 20 disposable pipettes</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>11.4</i>
Paracetamol tabletter 500 mg	1 x 20 st 1 x 100 st	3 –	3 –	– 1	– 1	– 1	– 2	7.1
<i>Paracetamol tablets 500 mg</i>	<i>1 x 30 pcs 1 x 100 pcs</i>	<i>2 –</i>	<i>2 –</i>	<i>– 1</i>	<i>– 1</i>	<i>– 1</i>	<i>– 2</i>	<i>7.1</i>
Paracetamol-kodein tabletter, 500 mg/30 mg	1 x 20 st	2	2	5	3	5	10	Narkotika, 7.2
<i>Paracetamol – codeine tablets, 500 mg/30 mg</i>	<i>1 x 20 pcs</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>Narcotics, 7.2</i>
Pilokarpin, 2 %, ögondroppar	4 x 5 ml	0,5	1	1	1	1	2	10.4
<i>Pilocarpine, 2 %, eye drops</i>	<i>4 x 5 ml</i>	<i>0,5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>10.4</i>
Prometazin tabletter 25 mg	1 x 30 st	1	1	1	1	2	4	6.5
<i>Promethazine tablets 25 mg</i>	<i>1 x 30 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6.5</i>

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar						Anmärkning, gruppnr
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	
Propiomazin tabletter 25 mg	1 x 20 st	–	–	–	1	2	4	6.3
<i>Propiomazine tablets 25 mg</i>	<i>1 x 20 pcs</i>	–	–	–	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6.3</i>
Revaxör suspension	1 förpackning	–	–	–	1	2	4	11.2
<i>Ear wax removal suspension</i>	<i>1 pack</i>	–	–	–	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>11.2</i>
Skopolamin 1 mg/72 timmar	1 x 5 st	1	2	2	1	2	3	6.2
<i>Hyoscine 1 mg/72 hours</i>	<i>1 x 5 pcs</i>	1	2	2	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6.2</i>
Tandfyllningsme- del, provisoriskt	1 förpackning	–	–	–	1	1	1	14.5
<i>Temporary tooth filling material</i>	<i>1 pack</i>	–	–	–	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>14.5</i>
Terbutalin 0,5 mg/dos	1 x 120 doser	2	3	5	3	5	7	9.2
<i>Terbutaline 0.5 mg/dose</i>	<i>1 x 120 doses</i>	2	3	5	3	5	7	<i>9.2</i>
Tetrakain ögondroppar 1 %	1 x 20 doser à 0,5 ml	1	1	1	1	1	1	10.2
<i>Tetracaine eye drops 1 %</i>	<i>1 x 20 doses of 0.5 ml</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>10.2</i>
Tranexamsyra tabletter 500 mg	1 x 60 st	1	1	1	1	2	4	11.5, 14.1
<i>Tranexamic acid tablets 500 mg</i>	<i>1 x 60 pcs</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>11.5, 14.1</i>
Zolpidem tabletter 5 mg	1 x 14 st	–	–	–	1	2	4	Narkotika, 6.4
<i>Zolpidem tablets 5 mg</i>	<i>1 x 14 pcs</i>	–	–	–	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>Narcotics, 6.4</i>

(TSFS 2022:62)

Bilaga B. Läkemedel och deras användning

Doseringsanvisningarna i denna bilaga gäller enbart angivna exempel. Om annat läkemedel används ska doseringsanvisningen kontrolleras med dess bipacksedel.

INDIKATIONER	GRUPPNR	LÄKEMEDEL
TARM OCH URINVÄGAR		
Magkatarr, magsår, halsbränna	1.1	Verksamt ämne: Antacida innehållande aluminium och magnesiumsalter Exempel: Novaluzid Form: Tuggtabletter Funktion: Binder överskott av saltsyra i magen Dosering: 1–2 tuggtabletter vid behov
	1.2	Verksamt ämne: Omeprazol Exempel: Losec Form: Kapslar 20 mg Funktion: Verksamt bland annat mot sår i tolvfingertarmen. Anmärkning: Ska sväljas hela. Får inte krossas eller tuggas. Dosering: Endast efter läkarordination. 1 kapsel dagligen i 2 veckor.
Gallstens- och njurstensanfall	1.3	Verksamt ämne: Diklofenak Exempel: Voltaren Form: Stolpiller 50 mg Funktion: Inflammationsdämpande, smärtstillande och febernedsättande Anmärkning: Får inte kombineras med andra smärtlindrande medel utan att fråga läkare. Skyddas mot fukt. Ska inte användas vid acetylsalicylsyraallergi. Dosering: Endast efter läkarordination. 1–3 stolpiller per dygn
	1.4	Verksamt ämne: Morfin Exempel: Morfin Form: Injektionsvätska 10 mg/ml Funktion: Kraftigt smärtstillande Anmärkning: Narkotika Dosering: Endast efter läkarordination. 1–1,5 ml subkutant eller intramuskulärt 1–3 gånger
Diarré	1.5	Verksamt ämne: Loperamid Exempel: Imodium Form: Tabletter 2 mg Funktion: Minskning av tarmens rörelser och motverkar vätskeförlust Dosering: 2 tabletter, därefter 1 tablett vid varje diarré tillfälle, dock högst 8 tabletter per dygn

Diarré vid bakteriella tarminfektioner	1.6	<p>Verksamt ämne: Ciprofloxacin Exempel: Ciprofloxacin Hexal Form: Tabletter 250 mg Funktion: Hindrar bakterietillväxt Anmärkning: Tas inte vid samma tidpunkt som mjölkprodukter, läkemedel mot sur mage, halsbränna eller läkemedel som innehåller järn. Dosering: Endast efter läkarordination. 2 tabletter två gånger under ett dygn. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>
Blindtarmsinflammation	1.7	<p>Verksamt ämne: Metronidazol Exempel: Flagyl Form: Tabletter 400 mg Funktion: Dödar vissa typer av mikroorganismer Anmärkning: Metronidazol används i kombination med Ciprofloxacin Dosering: Endast efter läkarordination. 1 tablett tre gånger dagligen. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>
Förstoppning	1.8	<p>Verksamt ämne: Natriumpiko-sulfat Exempel: Laxoberal Form: Droppar 7,5 mg/ml Funktion: Påskyndar rörelserna i tjocktarmen Anmärkning: Om laxermedel används mer än en vecka bör läkare konsulteras Dosering: 10 droppar vid ett tillfälle dagligen</p>
	1.9	<p>Verksamt ämne: Natriumcitrat (dihydrat) Natriumlaurylsulfoacetat Exempel: Microlax Form: Klysma 5 ml Funktion: Ökar vätskemängden i hård feces Dosering: Innehållet i en tub appliceras rektalt vid behov</p>
Hemorroider, ändtarmsklåda	1.10	<p>Verksamt ämne: Lidokain Exempel: Xylocain Form: Salva 5 % Funktion: Smärtstillande Anmärkning: Utvärtes användning. Förvaras i rumstemperatur. Om besvären inte går över efter 2–3 veckor bör läkare kontaktas. Dosering: Påstryks tunt</p>

HJÄRTA OCH KÄRL		
Kärlkramp	2.1	<p>Verksamt ämne: Glyceryltrinitrat (nitroglycerin) Exempel: Nitrolingual Form: Oral spray 0,4 mg/dos Funktion: Kärlvidgande Anmärkning: Förvaras i originalförpackning som tillsluts väl Dosering: Endast efter läkarordination. Vid behov sprayas 1–2 doser (0,4–0,8 mg) på munslimhinnan under tungan utan att andas in.</p>
	2.2	<p>Verksamt ämne: Metoprolol Exempel: Seloken ZOC Form: Depottabletter 100 mg Funktion: Dämpar hjärtverksamheten och förebygger därigenom kärlkramp i hjärtat m.m. Anmärkning: Får inte tuggas eller krossas Dosering: Endast efter läkarordination. 1 tablett en gång dagligen</p>
Hjärtsvikt	2.3	<p>Verksamt ämne: Furosemid Exempel: Furosemid Form: Tabletter 40 mg Funktion: Vätskedrivande Dosering: Endast efter läkarordination. 1 tablett 1–2 gånger dagligen</p>
	2.4	<p>Verksamt ämne: Furosemid Exempel: Furosemid Form: Injektionsvätska 10 mg/ml Funktion: Vätskedrivande Dosering: Endast efter läkarordination. 2–4 ml intravenöst.</p>
Långsam hjärtverksamhet, hjärtstillestånd	2.5	<p>Verksamt ämne: Adrenalin Exempel: Adrenalin Form: Injektionsvätska 1 mg/ml Funktion: Lindring av kramp och slemhinnesvullnad i luftvägarna. Kraftigt ökad hjärtverksamhet. Anmärkning: Mycket potent läkemedel. Eventuell kylvara, se bipacksedel. Dosering: Endast efter läkarordination. Individuell dosering.</p>
	2.6	<p>Verksamt ämne: Atropin Exempel: Atropin Form: Injektionsvätska 0,5 mg/ml Funktion: Ökning av hjärtfrekvens Dosering: Endast efter läkarordination. 1–2 ml intravenöst</p>

Förmaksflimmer	2.7	<p>Verksamt ämne: Digoxin Exempel: Digoxin BioPhausia Form: Tabletter 0,13 mg Funktion: Ökning av hjärtats samman- dragningskraft, minskning av hjärtfrekvens och reglering av hjärtrytm Anmärkning: Mycket potent läkemedel. Dosering: Endast efter läkarordination. Individuell dosering.</p>
Hjärtinfarkt	2.8	<p>Verksamt ämne: Morfin Exempel: Morfin Form: Injektionsvätska 10 mg/ml Funktion: Kraftigt smärtstillande Anmärkning: Narkotika Dosering: Endast efter läkarordination. 1–1,5 ml subkutant eller intramuskulärt</p>
HUD		
Torr hud	3.1	<p>Verksamt ämne: Mjukgörande kräm/salva Exempel: Unguentum Merck Form: Kräm Funktion: Mjukgörande Anmärkning: Utvärtes användning Dosering: Påstryks tunt vid behov</p>
Eksem, klåda, hudinflammation	3.2	<p>Verksamt ämne: Hydrokortison Exempel: Hydrokortison Form: Kräm 1 % Funktion: Inflammationshämmande Anmärkning: Utvärtes användning. Undvik att få preparatet i ögonen. Dosering: Påstryks tunt morgon och kväll</p>
Infekterad hud	3.3	<p>Verksamt ämne: Fusidinsyra Exempel: Fucidin Form: Salva 2 % Funktion: Bakteriehämmande Anmärkning: Utvärtes användning. Undvik att få preparatet i ögonen. Dosering: Endast efter läkarordination. 2–3 gånger dagligen.</p>
Lättare brännskada	3.4	<p>Verksamt ämne: Lidokain Exempel: Xylocain Form: Salva 5 % Funktion: Smärtstillande Anmärkning: Utvärtes användning. Förvaras i rumstemperatur Dosering: Påstryks tunt</p>
Klåda	3.5	<p>Verksamt ämne: Kalamín-kalciumhydroxid Exempel: Kylbalsam Form: Liniment Funktion: Klådstillande, kylande Anmärkning: Utvärtes användning Dosering: Påstryks tunt</p>

	3.6	<p>Verksamt ämne: Loratadin Exempel: Clarityn Form: Tabletter 10 mg Funktion: Motverkar effekterna av histamin, som utlöser klåda i huden, rinnsnuva och nästäppa Anmärkning: Dosering: Endast efter läkarordination. 1 tablett dagligen</p>
Skabb, löss	3.7	<p>Verksamt ämne: Disulfiram-bensylbensoat Exempel: Tenutex Form: Liniment 100 g Funktion: Parasitdödande Anmärkning: Utvärtens användning. Undvik att få preparatet i ögonen. Förvaras i kylskåp Dosering: <i>Huvudlöss:</i> 25-75 g inarbetas i hårbotten. Efter ett dygn tvättas håret och finkammas. Ofta krävs behandling två gånger med åtta dagars mellanrum. Inspektera håret dagligen under 14 dagar efter behandlingen. <i>Flatlöss:</i> 50 g inmasseras i skrev, armhålor och andra hårbevuxna ställen på kroppen. Efter två dygn får kroppen tvättas. <i>Skabb:</i> Efter tvätt masseras hela kroppen in med 50–60g, dock ej huvudet. Efter ett dygn kan kroppen tvättas.</p>
INFEKTIONER		
Lunginflammation, svårt infekterade sår med feber, blodförgiftning, bakteriell hjärnhinneinflammation	4.1	<p>Verksamt ämne: Cefotaxim Exempel: Claforan Form: Injektionsvätska Funktion: Verksam mot olika infektionsframkallande bakterier Dosering: Endast efter läkarordination. Normaldos; 1 g var 12:e timme, vid svåra infektioner 2 g var 8:e–12:e timme.</p>
Bakteriell tarminfektion	4.2	<p>Verksamt ämne: Ciprofloxacin Exempel: Ciprofloxacin Hexal Form: Tabletter 250 mg Funktion: Hindrar bakterietillväxt Anmärkning: Tas inte samtidigt som läkemedel mot sur mage och halsbränna samt läkemedel som innehåller järn. Dosering: Endast efter läkarordination. 2 tabletter två gånger dagligen 5–14 dagar. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>
Bakteriella luftvägsinfektioner såsom halsfluss, öron-, bihåle- och lunginflammation	4.3	<p>Verksamt ämne: Fenoximetylpenicillin. Exempel: Kåvepenin Form: Tabletter 1 g Funktion: Hindrar bakterietillväxt Dosering: Endast efter läkarordination. 1–2 tabletter var 12:e timme. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>

	4.4	<p>Verksamt ämne: Doxycyklin Exempel: Vibramycin Form: Tabletter 100 mg Funktion: Hindrar bakterietillväxt Anmärkning: Tas i samband med måltid. Tas inte samtidigt som läkemedel som innehåller järn. Dosering: Endast efter läkarordination. Första dagen 2 tabletter, därefter 1 tablett dagligen. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>
	4.5	<p>Verksamt ämne: Ciprofloxacin Exempel: Ciprofloxacin Hexal Form: Tabletter 250 mg Funktion: Hindrar bakterietillväxt Anmärkning: Tas inte samtidigt som läkemedel mot sur mage och halsbränna samt läkemedel som innehåller järn. Dosering: Endast efter läkarordination. Två tabletter två gånger dagligen. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>
Nedre urinvägsinfektioner	4.6	<p>Verksamt ämne: Ciprofloxacin Exempel: Ciprofloxacin Hexal Form: Tabletter 250 mg Funktion: Hindrar bakterietillväxt Anmärkning: Tas inte samtidigt som läkemedel mot sur mage och halsbränna samt läkemedel som innehåller järn. Dosering: Endast efter läkarordination. ½ tablett var 12:e timme. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>
Övre urinvägsinfektion, prostatainfektion	4.7	<p>Verksamt ämne: Ciprofloxacin Exempel: Ciprofloxacin Hexal Form: Tabletter 250 mg Funktion: Hindrar bakterietillväxt Anmärkning: Tas inte samtidigt som läkemedel mot sur mage och halsbränna samt läkemedel som innehåller järn. Dosering: Endast efter läkarordination. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare. Två tabletter två gånger dagligen.</p>
	4.8	<p>Verksamt ämne: Doxycyklin Exempel: Vibramycin Form: Tabletter 100 mg Funktion: Hindrar bakterietillväxt Anmärkning: Tas i samband med måltid. Tas inte samtidigt som läkemedel som innehåller järn. Dosering: Endast efter läkarordination. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare. Första dagen två tabletter, därefter en tablett dagligen.</p>

Svampinfektion i underlivet	4.9	<p>Verksamt ämne: Ekonazol Exempel: Pevaryl Form: Slidpiller 150 mg Funktion: Mot svampinfektion Anmärkning: Införes i slidan. Dosering: Endast efter läkarordination. Ett slidpiller dagligen i tre dagar. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>
Svampinfektion, fotsvamp	4.10	<p>Verksamt ämne: Klotrimazol Exempel: Canesten Form: Kräm 1 %. Anmärkning: Utvärtes användning. Dosering: Påstryks tunt morgon och kväll. Avbryt inte behandlingen utan att fråga läkare.</p>
Gonorré	4.11	<p>Verksamt ämne: Doxycyclin Exempel: Vibramycin Form: Tabletter 100 mg Funktion: Hindrar bakterietillväxt. Tas i samband med måltid. Tas inte samtidigt som läkemedel som innehåller järn. Dosering: Endast efter läkarordination. Första dagen två tabletter, sedan en tablett dagligen. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>
	4.12	<p>Verksamt ämne: Ciprofloxacin Exempel: Ciprofloxacin Hexal Form: Tabletter 250 mg Funktion: Hindrar bakterietillväxt Anmärkning: Tas inte samtidigt som läkemedel mot sur mage och halsbränna eller läkemedel som innehåller järn. Dosering: Endast efter läkarordination. Två tabletter som engångsdos.</p>
Anaerobinfektion	4.13	<p>Verksamt ämne: Metronidazol Exempel: Flagyl Form: Tabletter 400 mg Funktion: Dödar vissa mikroorganismer Anmärkning: Metronidazol används i kombination med Ciprofloxacin. Dosering: Endast efter läkarordination. En tablett tre gånger dagligen. Avbryt inte ordinerad behandling utan att fråga läkare.</p>
FÖREBYGGANDE MEDEL		
Malaria, förebyggande och behandling	5.1	<p>Verksamt ämne: Atovakvon/proguanil Exempel: Atovakvon / Proguanil Glenmark Form: Tabletter 250 mg/100 mg Dosering: Endast efter läkarordination. En tablett dagligen.</p>

Malaria, förebyggande och behandling	5.2	<p>Verksamt ämne: Klorokin Exempel: Klorokinfosfat Form: Tabletter 250 mg Anmärkning: Personer med psoriasis ska inte använda klorokin. Dosering: Endast efter läkarordination. Två tabletter en gång per vecka.</p>
Malaria, behandling	5.3	<p>Verksamt ämne: Meflokin Exempel: Lariam Form: Tabletter 250 mg Anmärkning: Bör sväljas hela. Dosering: Endast efter läkarordination. Tre tabletter initialt. Efter 6–8 tim. ytterligare en tablett.</p>
Stelkrampvaccin	5.4	<p>Verksamt ämne: Clostridium tetanitoxoid Exempel: diTeBooster Form: Injektionsvätska, förfylld spruta Funktion: Re-vaccinering mot stelkramp och grundvaccinering av personer som saknar, har ofullständig eller okänd grundvaccinering. Tetanusprofylax hos personer med skador med risk för stelkramp. Anmärkning: Kombinerad med difterivaccin. Dosering: Ges intramuskulärt som engångsdos.</p>
NERVSYSTEMET		
Sjösjuka	6.1	<p>Verksamt ämne: Meklozin Exempel: Postafen Form: Tabletter 25 mg Funktion: Förebygger och lindrar illamående och kräkningar Dosering: Endast efter läkarordination. 1 tablett var 12:e timma.</p>
	6.2	<p>Verksamt ämne: Skopolamin Exempel: Scopoderm Form: Depotplåster 1 mg/72 timmar Funktion: Förebygger och lindrar illamående och kräkningar Dosering: Endast efter läkarordination. Ett plåster var tredje dygn.</p>
Insomningssvårigheter	6.3	<p>Verksamt ämne: Propiomazin Exempel: Propavan Form: Tabletter 25 mg Funktion: Centralt dämpande och lugnande Dosering: Endast efter läkarordination. 1–2 tabletter 30–60 minuter före sänggående.</p>

	6.4	<p>Verksamt ämne: Zolpidem Exempel: Stilnoct Form: Tabletter 5 mg Funktion: Snabbverkande sömnmedel för kortvarig behandling av sömnlöshet. Anmärkning: Beroendeframkallande. Narkotika. Dosering: Endast efter läkarordination. 1–2 tabletter som engångsdos i samband med sänggåendet.</p>
Svår oro	6.5	<p>Verksamt ämne: Prometazin Exempel: Lergigan Form: Tabletter 25 mg Funktion: Lugnande Anmärkning: Kan ge muntorrhet. Dosering: Endast efter läkarordination.</p>
Krampanfall	6.6	<p>Verksamt ämne: Diazepam Exempel: Stesolid Form: Klysma (lavemangsväska) 10 mg Funktion: Lugnande och muskelavslappande Anmärkning: Narkotika. Förvaras i rumstemperatur. Dosering: Endast efter läkarordination. En klysma införs i ändtarmen.</p>
SMÄRTA		
Lätt smärta	7.1	<p>Verksamt ämne: Paracetamol Exempel: Panodil Form: Tabletter 500 mg Funktion: Smärtstillande och febernedsättande Anmärkning: Kombinera inte med andra smärtstillande medel utan att fråga läkare Dosering: 1–2 tabletter 1–4 gånger dagligen</p>
Medelsvår smärta	7.2	<p>Verksamt ämne: Paracetamol-kodein Exempel: Citodon Form: Tabletter Funktion: Smärtstillande och febernedsättande Anmärkning: Narkotika. Använd inte vid gallvägsbesvär. Samtidigt intag av alkohol bör undvikas. Kombinera inte med andra smärtstillande medel utan att fråga läkare. Dosering: Endast efter läkarordination. 1–2 tabletter 1–4 gånger dagligen.</p>
Svår smärta	7.3	<p>Verksamt ämne: Morfin Exempel: Morfin Form: Injektionsvätska 10 mg/ml Funktion: Kraftigt smärtstillande Anmärkning: Narkotika. Dosering: Endast efter läkarordination. 1–1,5 ml subkutant eller intramuskulärt</p>

Menstruationssmärta, led-, rygg- eller muskelvärk	7.4	Verksamt ämne: Ibuprofen Exempel: Ipren Form: Tabletter 200 mg Funktion: Smärtstillande och febernedsättande Dosering: 1–2 tabletter 1–3 gånger per dygn
BEDÖVNING		
Lokalbedövning	8.1	Verksamt ämne: Lidokain Exempel: Xylocain Form: Injektionsvätska 10 mg/ml Funktion: Smärtstillande Dosering: Endast efter läkarordination. Individuell dosering
	8.2	Verksamt ämne: Lidokain Exempel: Xylocain Form: Salva 5 % Funktion: Smärtstillande Anmärkning: Utvärtes användning. Förvaras i rumstemperatur. Dosering: Påstryks tunt
	8.3	Verksamt ämne: Lidokain Exempel: Xylocain Form: Gel 2 % Funktion: Smärtstillande Anmärkning: Används vid kateterisering exempelvis vid undersökning av urinrör och tömning av urinblåsa Dosering: 20 ml för män, 5–10 ml för kvinnor i urinröret
LUNGOR		
Torrhosta	9.1	Verksamt ämne: Noskapin Exempel: Nipaxon Form: Tabletter 50 mg Funktion: Dämpning av hostreflexen Dosering: 1 tablett 3 gånger dagligen
Astma	9.2	Verksamt ämne: Terbutalin Exempel: Bricanyl, Turbuhaler Form: Inhalationspulver 0,5 mg/dos Funktion: Kramplösande och utvidgande av luftvägarna Dosering: Endast efter läkarordination. 1–2 inhalationer vid behov
	9.3	Verksamt ämne: Betametason Exempel: Betapred Form: Tabletter 0,5 mg Funktion: Antiinflammatorisk och antiallergisk verkan Anmärkning: Löses i vatten Dosering: Endast efter läkarordination. Individuell dosering.

Kraftig allergisk reaktion	9.4	<p>Verksamt ämne: Adrenalin Exempel: Epipen Form: Injektionsvätska 0,3 mg/dos, förfylld injektionspenna Funktion: Akutbehandling av anafylaktisk överkänslighetsreaktion Anmärkning: Kontakta Tele Medical Assistance Service. Mycket potent läkemedel. Får inte förvaras i kylskåp. Får inte användas efter utgångsdatum eller om lösningen är missfärgad eller innehåller utfällning. Dosering: Endast efter läkarordination. Engångsdos 0,3 mg, upprepa efter 5–15 minuter om den allergiska reaktionen inte har hävts vid den första dosen.</p>
ÖGON		
Bakteriella infektioner, främmande föremål i ögat	10.1	<p>Verksamt ämne: Kloramfenikol Exempel: Kloramfenikol Santen Form: Ögonsalva 1 % Funktion: Dämpar bakteriella infektioner i ögats bindhinna, hornhinna och ögonlock Dosering: Endast efter läkarordination. Appliceras flera gånger dagligen.</p>
Svetsblänk	10.2	<p>Verksamt ämne: Tetrakain Exempel: Tetracainehydrochloride Form: Ögondroppar 1 % Funktion: Lokalbedövning Dosering: Endast efter läkarordination. 1–2 droppar i ögat</p>
Främmande vätska eller föremål	10.3	<p>Verksamt ämne: Natriumklorid (koksalt) Form: Vätska 9 mg/ml Anmärkning: Utvärtes användning Dosering: Skölj rikligt</p>
Förhöjt ögontryck, glaukom	10.4	<p>Verksamt ämne: Pilokarpin Exempel: Pilokarpin APL Form: Ögondroppar, 2 % Funktion: Sänker trycket i ögat Dosering: Endast efter läkarordination. 1 droppe i ögat 2–3 gånger per dygn.</p>
ÖRON, NÄSA, HALS		
Hörselgångsinflammation	11.1	<p>Verksamt ämne: Oxitetracyklinhydrokortison-polymyxin B Exempel: Terracortril med polymyxin B Form: Droppar Funktion: Inflammationsdämpande, antiallergisk, hämning av lokal bakterietillväxt i hörselgången Anmärkning: Omskakas före användning. Öppnad förpackning är hållbar i en månad. Dosering: Endast efter läkarordination. 2–4 droppar i yttre hörselgången 3 gånger dagligen.</p>

Vaxpropp	11.2	Exempel: Revaxör Form: Droppar Dosering: Enligt bruksanvisning
Hösnuva, allergi	11.3	Verksamt ämne: Loratadin Exempel: Clarityn Form: Tabletter 10 mg Funktion: Motverkar klåda i huden, rinnsnuva och nästäppa Dosering: Endast efter läkarordination. En tablett dagligen.
Nästäppa	11.4	Verksamt ämne: Oxymetazolin Exempel: Nezeril Form: Näsdroppar endospipetter 0,5 mg/ml Funktion: Avsvällande effekt på nässlemhinnan Dosering: 3 droppar i vardera näsborre 2–3 gånger dagligen
Näsblödning, svår	11.5	Verksamt ämne: Tranexamsyra Exempel: Cyklokapron Form: Tabletter 500 mg Funktion: Blödningshämmande och påskyndar läkning Dosering: Endast efter läkarordination. 3 tabletter 4 gånger dagligen under 4–10 dygn
INFUSIONSVÄTSKA		
(tillförsel av vätska som dropp via en blodåder)	12.1	Verksamt ämne: Glukos Exempel: Glucos Form: Infusionsvätska 50 mg/ml buffrad Funktion: Glukoslösning för initial rehydrering och vätskeunderhåll Dosering: Endast efter läkarordination
	12.2	Verksamt ämne: Natriumklorid-kaliumkloridkalciumklorid-magnesiumklorid-natriumacetat Exempel: Ringer-acetat Form: Infusionsvätska 10 % Funktion: Ersätter salt- och vätskebrist Dosering: Endast efter läkarordination
	12.3	Verksamt ämne: Natriumklorid -succinylerat gelatin Exempel: Gelofusine Form: Infusionsvätska Funktion: Plasmaersättningsmedel Anmärkning: Dosering: Endast efter läkarordination

FÖRGIFTNING		
Förgiftning	13.1	Verksamt ämne: Medicinskt kol Exempel: Carbomix Form: Brusgranulat Funktion: Binder skadliga ämnen och förhindrar därmed att de tas upp i kroppen Anmärkning: Blandas i flaskan vid akut förgiftning Dosering: ca 150 ml (1 flaska)
ÖVRIGT		
Menstruation, svår blödning	14.1	Verksamt ämne: Tranexamsyra Exempel: Cyklokapron Form: Tabletter 500 mg Funktion: Blödningshämmande Dosering: Endast efter läkarordination. 2–3 tabletter 2–3 gånger per dygn.
Sårbehandling, m.m.	14.2	Verksamt ämne: Klorhexidin Exempel: Klorhexidin Form: Desinfektionsvätska 0,5 mg/ml Funktion: Bakteriedödande Anmärkning: Utvärtes användning. Använd inte i öronen. Dosering: Skölj rikligt
	14.3	Verksamt ämne: Natriumklorid (koksalt) Form: Spolvätska 9 mg/ml Anmärkning: Utvärtes användning Dosering: Skölj rikligt
	14.4	Verksamt ämne: Klorhexidinetanol Exempel: Klorhexidinsprit. Form: Desinfektionsvätska 5 mg/ml Funktion: Bakteriedödande Anmärkning: Använd för desinficering av händer och hud inför injicering. Utvärtes användning Dosering: Fukta huden
Tandvärk	14.5	Exempel: Coltosol Funktion: Tandfyllningsmedel Dosering: Enligt bruksanvisning
Mun- och svalginfektion	14.6	Verksamt ämne: Klorhexidin Exempel: Hexident Funktion: Antiseptiskt munvårdsmedel Anmärkning: Skölj 30 min efter tandborstning med tandkräm. Efter tandborstningen ska munnen sköljas med vatten. Dosering: Två gånger dagligen med ca 10 ml vätska under minst 1 minut

Bilaga C. Behandlingsutrustning m.m.

Utrustning m.m.	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar					
		A1	A2	A3	B1	B2	B3
1. ÅTERUPPLIVNINGСУTRUSTNING							
Andningsballong	1 st	1	1	2	1	2	4
Ansiktsmask nr 2,3,4	1 set	1	1	2	1	2	4
Oxygenapparat och sug	1 st	1	1	2	1	2	4
Oxygen i trycktub (200 bar)	2 st å 2,5 liter	2	2	4	2	4	8
Sugkateter	1 st	1	1	2	1	2	4
Svalgtub, två storlekar	1 x 2 st	1	1	1	1	1	1
2. BANDAGE OCH SUTURERINGSUTRUSTNING							
Absorberande förband, 10 cm x 20 cm	1 st	1	3	5	3	5	10
Binda, elastisk, 5 m x 8 cm	1 st	2	5	10	5	10	20
Binda, elastisk, 5 m x 10 cm	1 st	2	5	10	5	10	20
Blodstoppare, stora	1 st	2	3	10	3	5	10
Brännskadeförband	1 x 10 st	1	1	2	1	2	4
Brännskadelakan	1 st	1	2	4	2	3	6
Förband, typ Snögg, Primapore, Tegaderm, ca 6 cm	1 st	1	2	3	2	2	4
Kirurgtape t.ex. Micropore, Transpore, 5 m x 2,5 cm	1 st	2	3	5	2	4	7
Kompresser, sterila, 7 cm x 10 cm	1 x 10 st	2	2	4	2	5	10
Mitella	1 st	1	3	5	1	3	5
Omläggningssset, engångs, sterilt	1 st	2	4	10	4	6	10
Plåster, sorterade storlekar	1 st	2	3	5	2	4	10
Plåster, väv, med sårdyna, 5 m x 6 cm	1 st	1	1	2	1	1	2
Suturtråd med nål, steril 3:0	1 st	1	1	2	1	2	3
Suturtråd med nål, steril 4:0	1 st	1	1	2	1	2	3
Suturtråd med nål, steril 5:0	1 st	1	1	2	1	2	3
Suturtagningssset	1 st	3	3	6	3	6	10
Suturtape, ca 6 x 75 mm	1 st	2	3	5	3	5	10
Säkerhetsnålar, rostfria	1 x 10 st	1	1	3	1	1	3

Utrustning m.m.	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar					
		A1	A2	A3	B1	B2	B3
Tourniquet	1 st	1	1	1	1	1	1
Tryckavlastande förband ex Compeed, Duoderm	1 x 5 st	1	1	2	1	1	2
Tubförband för armar och händer	1 st	1	1	1	1	1	1
Tubförband för ben och huvud	1 st	1	1	1	1	1	1
Tubförband för fingrar och tår	1 st	1	1	1	1	1	1
3. INSTRUMENT							
Artärklämma (peang), böjd ca 16 cm	1 st	1	1	2	1	2	2
Främmandekroppstång	1 st	–	–	–	1	1	1
Nålförare ca 17 cm (om suturtråd finns ombord)	1 st	1	1	1	1	1	1
Pincett, anatomisk ca 13 cm	1 st	1	1	2	1	2	3
Pincett, hak, 2–3 klor, ca 13 cm	1 st	1	1	2	1	2	3
Pincett, stick	1 st	1	1	1	1	1	1
Rakhyvlar, engångs	10 st	–	–	–	1	1	1
Sax, böjd	1 st	1	1	1	1	1	1
Sax, Esmarck ca 20 cm	1 st	1	1	1	1	1	1
Sax, kirurgisk	1 st	1	1	1	1	1	1
Sax, ögon, rak	1 st	1	1	1	1	1	1
Skalpell, engångs, steril	10 st	–	–	–	1	1	2
Sår- och sköljspruta, engångs	5 st	1	2	2	2	2	4
Tandfyllningsspatel	1 st	–	–	–	1	1	1
Tandspegel	1 st	–	–	–	1	1	1
Ögoninstrument för borttagande av främmande kropp	1 st	–	–	–	1	1	1
4. UNDERSÖKNINGS- OCH KONTROLLINSTRUMENT							
Träspatlar	100 st	1	1	1	1	1	1
Reagensremsor: äggvita, socker, blod i urin	50 st	–	–	–	1	1	1
Reagensremsor: bakterier i urin	10 st	–	–	–	1	1	1
Stetoskop med enbart membran	1 st	1	1	1	1	1	1
Blodtrycksmätare	1 st	1	1	1	1	1	1
Febertermometer, mun	1 st	1	2	2	1	2	2

Utrustning m.m.	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar					
		A1	A2	A3	B1	B2	B3
Febertermometer, rektal	1 st	1	1	2	1	2	2
Malariatest (endast om fartyget opererar i malriadrabbat område)	5 st	1	2	3	1	2	3
5. UTRUSTNING FÖR INJEKTION, VÄTSKEÖVERFÖRING, PUNKTERING OCH KATETERISERING							
Blåspunktionsset, Suprapubik (BARD)	1 set	–	–	–	1	1	2
Kateter Thiemann Nr 16 för engångsbruk, steril	1 st	–	–	–	1	2	2
Kateter Thiemann Nr 14 för engångsbruk, steril	1 st	–	–	–	1	2	2
Kateter, Ch 12, för engångsbruk, steril	1 st	–	–	–	1	2	2
Kateteriseringsset, engångs, steril	1 st	–	–	–	2	4	4
Infusionsaggregat L76	1 st	3	3	3	6	12	20
Infusionsnålar, Venflon, olika grovlekar	1 st	3	3	3	6	12	20
Injektionskanyl, luerfattning, engångs (för intravenös injicering) 0,8 x 40 mm (grön)	1 st	10	10	10	20	30	50
Injektionskanyl, luerfattning, engångs (för intramuskulär injicering) 0,7 x 50 mm (svart)	1 st	10	10	10	10	30	30
Injektionskanyl, luerfattning, engångs (för uppdragning) 1,2 x 50 mm (rosa)	1 st	10	10	10	20	30	50
Injektionskanyl, luerfattning, engångs (för subkutant injicering) 0,6 x 25 mm (blå)	1 st	10	10	10	20	30	50
Injektionsspruta, luerfattning, engångs 10 ml	1 st	10	10	10	20	20	30
Injektionsspruta, luerfattning, engångs 5 ml	1 st	10	10	10	20	30	50
Injektionsspruta, luerfattning, engångs 2 ml	1 st	10	10	10	20	30	40
Magsond, Salemsond nr 18	1 st	1	1	1	1	1	1
Magsond, Salemsond nr 20	1 st	1	1	1	1	1	1

Utrustning m.m.	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar					
		A1	A2	A3	B1	B2	B3
6. ÖVRIG UTRUSTNING							
Stickbäcken	1 st	–	–	–	1	1	1
Kall/varm kudde	1 st	–	–	–	2	2	2
Urinflaska för män	1 st	–	–	–	1	1	2
Handskar, engångs av vinyl storlek L	5 par	1	1	2	1	2	4
Handskar, operations, sterila storlek L	1 par	–	2	4	2	4	8
Hörselskydd, proppar eller vadd	1 x 5 par	1	3	5	3	5	10
Bår	1 st	1	1	1	1	1	1
Bägare av plast med piplock	1 st	–	–	–	1	1	1
Nagelborste	1 st	1	2	2	2	2	2
Papperspåsar, små, för medicin	20 st	1	2	5	1	2	5
Ögonskydd med plastkupa	1 st	1	2	2	2	2	2
Ögonsköljflaska av plast	1 st	1	1	2	1	1	2
Ögonskölj kopp, flegångs	1 st	2	3	3	2	3	3
Instrumentlåda, rostfri med lock ca 26 x 15 x 5 cm	1 st	–	1	1	1	1	1
Hygienlakan, engångs	5 st	–	1	1	1	1	2
Lavemangspåsar, engångs	1 st	–	–	–	2	5	10
Rondskål, rostfri	1 st	1	1	1	1	1	1
Suspensoar	1 st	–	1	1	1	1	1
Munskydd för sjukvårdspersonal, engångs	1 x 50 st	1	1	1	1	1	1
Bomull	100 g	1	2	3	1	3	5
Bomullspinnar	100 st	1	1	1	1	1	2
Sterilt vatten Form: Ampuller 10 ml Dosering: Till beredning av injektionslösning	20 x 10 ml	–	–	–	1	1	1
7. IMMOBILISERINGSUTRUSTNING							
SAM-splint, arm/ben	1 st	1	1	1	1	1	1
Halskragar till exempel Laerdal Stifneck	1 st	1	2	3	1	2	3
8. DESINFEKTION M.M.							

Utrustning m.m.	Antal/mängd per förpackning	Antal förpackningar					
		A1	A2	A3	B1	B2	B3
Yt- och instrumentdesinfektion t.ex. VIRKON, 5 x 10 g	1 st	2	2	2	2	4	6
Vattenreningsmedel, tabletter	70 st	–	–	–	1	1	1
Insektsmedel för inomhusbruk	1 st	–	–	–	1	1	1
Bensin, medicinsk	1 x 100 ml	1	1	1	1	1	1
Dietyl-m-toluamid (myggmedel)	1 x 50 ml	Enligt befälhavarens bedömning.					
LITTERATUR M.M.							
Medicinsk handledning: "Läkarbok" (ex. International Medical Guide For Ships (WHO))	1 st	1	1	1	1	1	1
"Första hjälpen", t.ex. från Röda Korset	1 st	1	1	1	1	1	1
Blanketten Läkarkonsultation från fartyg	10 st	1	2	3	1	2	3

Bilaga D. Läkemedel och behandlingsutrustning m.m. för fartyg, som behöver högst två timmar för att nå anlöpbar hamn

Ett fartyg ska, för varje påbörjat antal av 25 personer i besättningen, vara utrustat med följande läkemedel och behandlingsutrustning m.m. För deras funktion och doseringsanvisningar, se bilaga B.

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning
Verksamt ämne: Glyceryltrinitrat Exempel: Nitrolingual Form: Oral spray 0,4 mg/dos	1 flaska à 200 doser
Verksamt ämne: Klorhexidin Exempel: Klorhexidin Form: Desinfektionsvätska 0,5 mg/ml	1 x 125 ml
Verksamt ämne: Lidokain Exempel: Xylocain Form: Salva 5 %	10 g
Verksamt ämne: Loperamid Exempel: Imodium Form: Tabletter 2 mg	1 x 16 st
Verksamt ämne: Meklozin Exempel: Postafen Form: Tabletter 25 mg	1 x 20 st
Verksamt ämne: Natriumklorid (koksalt) Form: Spolvätska 9 mg/ml Anmärkning: Alternativ: dusch - linstvätt 6 x 30 ml	6 x 30 ml
Verksamt ämne: Paracetamol Exempel: Panodil Form: Tabletter 500 mg	1 x 20 st

Behandlingsutrustning m.m.	Mängd
Blodstoppare, stora	3 st
Bomull / rondeller	100 g/st
Brännskadeförband	10 st
Elastisk binda, 8 cm bred	2 st
Elastisk binda, 10 cm bred	2 st
Handskar, engångs av vinyl, storlek L	5 par
Kirurgtape, 5 m x 2,5 cm	1 st

TSFS 2021:80*Bilaga D*

Kompresser, sterila, 7 cm x 10 cm	10 st
Pincett, stick	1 st
Plåster, sorterade storlekar	1 st
Sax, kirurgisk	1 st
Tourniquet	1 st
Ögonskölj kopp, flergångs	1 st
Första hjälpen broschyr	1 st
Handledning i behandling av nedkylda personer (hypotermi)	1 st

Bilaga E. Läkemedel och behandlingsutrustning m.m. för livbåtar och livflottar

En livbåt respektive livflotte ska, för varje påbörjat antal av 25 personer som den får medföra, vara utrustad med följande läkemedel och behandlingsutrustning m.m. För deras funktion och doseringsanvisningar, se bilaga B.

Läkemedel	Antal/mängd per förpackning
Verksamt ämne: Glyceryltrinitrat Exempel: Nitrolingual Form: Oral spray 0,4 mg/dos	1 flaska à 200 doser
Verksamt ämne: Klorhexidin Exempel: Klorhexidin Form: Desinfektionsvätska 0,5 mg/ml	1 x 125 ml
Verksamt ämne: Lidokain Exempel: Xylocain Form: Salva 5 %	10 g
Verksamt ämne: Loperamid Exempel: Imodium Form: Tabletter 2 mg	1 x 16 st
Verksamt ämne: Meklozin Exempel: Postafen Form: Tabletter 25 mg	4 x 10 st
Verksamt ämne: Natriumklorid (koksalt) Form: Spolvätska 9 mg/ml Anmärkning: Alternativ: dusch - linstvätt 6 x 30 ml	6 x 30 ml
Verksamt ämne: Paracetamol Exempel: Panodil Form: Tabletter 500 mg	1 x 100 st

Behandlingsutrustning m.m.	Mängd
Blodstoppare, stora	3 st
Brännskadeförband	10 st
Elastisk binda, 10 cm bred	2 st
Handskar, engångs av vinyl, storlek L	5 par
Kompresser, sterila, 7 cm x 10 cm	10 st
Plåster, sorterade storlekar	1 st
Sax, kirurgisk	1 st
Kirurgtejp, 5 m x 2,5 cm	1 st
Tourniquet	1 st
Ögonskölj kopp, flergångs	1 st

TSFS 2021:80

Första hjälpen broschyr	1 st
Handledning i behandling av nedkylda personer (hypotermi)	1 st