

Vägledning vid Covid-19 hos piloter, flygledare och kabinbesättning

1 Verifierad Covid-19?

Verifierad med PCR-test och/eller antikroppstitrar?

2 Sjukdomsförlopp: Insjuknande när? Duration? Vårdnivå? Intensivvård? Sövning? Läkemedelsbehandling? Kortisonkur? Antikoagulantia?

- Fokusera på andningsproblem. Konditionsnedsättning? Är konditionen helt tillbaka? Klarar sökanden att träna som vanligt?

- Helt återställd? Kvarstående symptom eller funktionshinder? Krävs fysisk flygläkarundersökning?

- Psyisk hälsa Nedstämdhet, kognitiv nedsättning, hjärntrötthet? Har sökanden sökt hjälp? Kvarstående kognitiv påverkan? Självskattning HAD eller motsvarande?

3 Inhämta **journaler** från vårdinrättningens journalsystem i första hand, utskrifter från 1177.se i andra hand.

4 Använd funktionen "Consultation" i Empic-MED i samband med Interim Assessment UNFIT/FIT (daganteckning) eller i samband med en flygmedicinsk förnyelseundersökning.

Prioriterad handläggning av AMS inom 1-2 dygn, annars ring.

Vaccinering för Covid-19: Minimum 48 timmar efter varje vaccinationsdos innan flygning/tjänstgöring. Vid kvarstående biverkningar skall samråd ske AME innan flygning/tjänstgöring.
(Enligt EASA SIB 2021-06 2021-03-25)

Ej EMA-godkänt vaccin: Minimum 30 dagar innan flygning/tjänstgöring.
(Enligt EASA 2020-12-16)

Bekräftad eller misstänkt covid-19?

(1)

